

È possibile soffrire di artrosi senza neppure esserne consapevoli. Se una delle seguenti affermazioni è applicabile al suo caso, si rivolga al suo medico.

Durante il riposo, il dolore alla mia articolazione è:

Lieve Moderato Acuto

Durante i movimenti, il dolore alla mia articolazione è:

Lieve Moderato Acuto

Dopo il risveglio o durante il riposo, la mia articolazione è:

Non rigida Piuttosto rigida Molto rigida

Dopo un'attività, la mia articolazione è:

Sensibile Dolorante Gonfia Arrossata

Scala visuale analogica

Quale livello descrive più accuratamente il dolore che prova attualmente?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Assenza di dolori

Dolori moderati

Il peggior dolore possibile

Descriva i suoi limiti

A causa della mia artrosi, sono limitato nelle seguenti attività (quotidiane):

A volte Regolarmente Di frequente

Esempi di attività in cui sono limitato:

(ad esempio, salire e scendere le scale, praticare uno sport, alzarsi da una sedia, ecc.) _____

Descriva le misure adottate finora

Ho già tentato di:

- Perdere peso e/o fare allenamento
- Assumere antidolorifici per via orale (paracetamolo e/o FANS)
- Fare fisioterapia

Descriva gli obiettivi per il miglioramento quotidiano

Il mio obiettivo principale per la prossima fase di trattamenti è:

- Alleviare il dolore
- Ridurre la rigidità
- Incrementare la mobilità

Descriva la caratteristiche o i benefici del prossimo trattamento rilevanti per lei

Il mio trattamento dovrebbe:

- Essere sicuro, con effetti collaterali limitati
- Assicurare un sollievo dal dolore prolungato
- Migliorare la mobilità

Riepilogo delle indicazioni per l'uso:

DUROLANE (3 ml): trattamento sintomatico dell'artrosi da lieve a moderata di ginocchio o anca. Inoltre DUROLANE è stato approvato nella UE per il trattamento sintomatico del dolore da artrosi da lieve a moderata di caviglia, spalla, gomito, polso, dita della mano e dita del piede.

DUROLANE SJ (1 ml): trattamento sintomatico del dolore da artrosi da lieve a moderato di caviglia, gomito, polso, dita delle mani e dita dei piedi. Sia DUROLANE sia DUROLANE SJ sono indicati anche per il dolore successivo ad artroscopia articolare in presenza di artrosi nei 3 mesi successivi alla procedura.

Non esistono controindicazioni note.

Non usare DUROLANE in caso di infezioni o malattie cutanee nel sito di iniezione. DUROLANE non è stato testato su donne in gravidanza o allattamento o sui bambini. I rischi possono includere dolore passeggero, gonfiore e/o rigidità nel sito di iniezione.

Informazioni complete sulla prescrizione sono disponibili sull'etichettatura, sul sito www.durolane.com.