

Osteoartróza Vlastné hodnotenie

DUROLANE[®]
kyselina hyalurónová, stabilizovaná, jedna injekcia

Môžete trpieť osteoartrózou a ani o tom nemusíte vedieť. Ak sa na vás vzťahuje niektoré z nižšie uvedených tvrdení, porozprávajte sa so svojím lekárom.

Keď oddychujem, bolesť v mojom kĺbe je:

mierna stredná závažná

Keď sa pohybujem, bolesť v mojom kĺbe je:

mierna stredná závažná

Keď sa zobudím alebo oddychujem, môj kĺb:

nie je stuhnutý je trochu stuhnutý je veľmi stuhnutý

Po činnosti je môj kĺb:

slabý boľavý opuchnutý červený

Vizuálna analógová stupnica

Ktorá úroveň v súčasnosti najlepšie vystihuje vašu bolesť?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

žiadna bolesť

stredná bolesť

najhoršia
predstaviteľná bolesť

Opíšte svoje obmedzenia

Kvôli osteoartróze sú moje (každodenné) činnosti obmedzené:

niekedy pravidelne často

Príklady činností, pri ktorých sa cítim obmedzený/-á, sú:

(napríklad chôdza po schodoch, športovanie, vstávanie zo stoličky a podobne) _____

Opíšte, čo ste vyskúšali

Už som vyskúšal/-a:

zníženie telesnej hmotnosti a/alebo cvičenie

perorálne lieky proti bolesti (paracetamol a/alebo NSAID (nesteroidné protizápalové lieky))

fyzioterapiu

Opíšte svoje ciele ohľadom zlepšenia počas dňa

Môj hlavný cieľ týkajúci sa ďalšieho kroku mojej liečby je:

úľava od bolesti

menšia stuhnutosť

zvýšená pohyblivosť

Opíšte povahu alebo výhody ďalšej liečby, ktoré sú pre vás dôležité

Moja liečba by mala:

byť bezpečná s malým množstvom nežiaducich účinkov

zabezpečiť trvajúcu úľavu od bolesti

zlepšiť moju pohyblivosť

Súhrn indikácií na použitie:

DUROLANE (3 ml): Symptomatická liečba miernej až stredne ťažkej osteoartrózy kolena alebo bedrového kĺbu. DUROLANE bol okrem toho schválený na symptomatickú liečbu spojenú s mierne až stredne ťažkou bolesťou asociovanou s osteoartrózou členka, ramena, lakťa, zápästia a prstov na rukách a nohách v EÚ.

DUROLANE SJ (1 ml): Symptomatická liečba spojená s mierne až stredne ťažkou bolesťou asociovanou s osteoartrózou členka, lakťa, zápästia a prstov na rukách a nohách. DUROLANE a DUROLANE SJ sú určené aj na liečbu bolesti po artroskopii kĺbu v prítomnosti osteoartrózy do 3 mesiacov od zákroku.

Žiadne kontraindikácie nie sú známe.

DUROLANE nesmiete používať, ak máte infekcie alebo kožné ochorenie v mieste podania injekcie. DUROLANE nebol testovaný u detí ani tehotných alebo dojčiacich žien. Riziká môžu zahŕňať prechodnú bolesť, opuch a/alebo stuhnutie v mieste podania injekcie.

Úplné informácie týkajúce sa predpisovania nájdete na označení produktu alebo na webovej stránke www.durolane.com.